



HEPATOLOJİDE BU HAFTA

Mart 2018 - Sayı:1

Hazırlayan: Prof.Dr Hüseyin Savaş Göktürk

DAA tedavisi alan ileri evre kronik Hepatti C hastalarında yeni tanı HCC. Prospektif popülasyon çalışması.

"Newly diagnosed Hepatocellular Carcinoma in patients with advanced hepatitis C treated with DAAs: a prospective population study"
Romano, Antonietta et al. Journal of Hepatolog Article in Press
DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.03.009>

Fibrozis evresi 3 ve üzeri olan 3917 hastanın dahil edildiği, ortalama takip süresinin 536.2±197.6 gün olduğu bu İtalyan çalışmasının sonuçlarına göre:

- DAA tedavisi sonrası HCC riskinde artış saptanmamıştır.
- HCC insidansı tedaviden 1 yıl sonra azalmaya başlamaktadır.
- Erken HCC gelişimi, önceden var olan mikroskopik saptanmamış tümöre bağlı olabilir.

Hazırlayan: Prof.Dr Hüseyin Savaş Göktürk

Yüksek risk grubunda oral kortikosteroid kullanımının HCC gelişim riski üzerine sinerjistik etkisi

Synergistic effect of oral corticosteroids use on risk of hepatocellular carcinoma in high risk populations
Lai, Shih-Wei et al. European Journal of Internal Medicine. Article in press.
DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ejim.2018.03.006>

2000-2011 yılları arasında HCC tanısı alan, yaşları 20 ile 84 arasında değişen 102.182 hastanın retrospektif olarak değerlendirildiği bu Tayvan kökenli çalışmanın sonuçlarına göre:

- HCC için kabul edilen risk faktörlerinin varlığında, süresi ile orantılı olarak, oral kortikosteroid kullanımı HCC gelişim riskini artırmaktadır.

Hazırlayan: Prof.Dr Hüseyin Savaş Göktürk

NASH tedavisinde NGM282: Çok merkezli, randomize, çift kör, plasebo kontrollü faz 2 çalışması

NGM282 for treatment of non-alcoholic steatohepatitis: a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 trial
Harrison, Stephen A et al. The Lancet, Online First.
DOI: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)30474-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30474-4)

Safra asidi sentez regülasyonunda ve glukoz dengesinde rol oynayan bir hormon olan FGF 19'un biyoteknolojik olarak üretilen anloğu olan MGM282'nin etkinliği ve güvenilirliğinin araştırmayı amaçlayan, biyopsi tanıli 82 hastanın dahil edildiği bu faz 2 çalışmanın sonuçlarına göre:

- 3 mg/gün dozundaki grupta 20 hastada (%74), 6 mg dozundaki grupta ise 22 hastada (%79), 12 haftalık tedavi sonunda, bazal karaciğer yağ miktarında en az %5 azalma elde edilmiştir.
- Bununla birlikte kabul edilebilir güvenlik profiline sahip olduğu saptanmıştır.

Bu bülten Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) tarafından, bilimsel genişleme katkı amacı ile hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır. Makalelerin içeriklerinin tıbbi ve hukuki sorumluluğu ilgili yazar ve yayınevlerine aittir. Paylaşılması istenen güncel makalelerin, formata uygun bir şekilde dernek e-posta adresine (tasl@tasl.org.tr) yollanması gerekmektedir.

TKAD adına sahibi: Ramazan İdilman (Başkan)

Bülten editörü: Arif Mansur Coşar

www.tasl.org.tr