



HEPATOLOJİDE BU HAFTA

Şubat2021 sayı 2

Hazırlayan: Dr. Sezgin Vatansever

Tekrarlanan FIB-4 ölçümleri ciddi karaciğer hastalığı riski altındaki bireylerin belirlenmesinde yardımcı olabilir

Repeated FIB-4 measurements can help identify individuals at risk of severe liver disease

Hannes Hagström et al, J. Hepatology 2020,73, 1023–1029

doi.org/10.1016/j.jhep.2020.06.007

Toplum temelli bu çalışmada 5 yıl içinde bakılan ikinci FIB-4 testi ile FIB-4'te 1 birimlik artış kronik karaciğer hastalığını predikte etmede ilişkili bulunmuş ((adjusted hazard ratio) 1.81; 95% CI 1.67–1.96). Sonuçlara göre hastalar düşük, orta ve yüksek riskli olarak sınıflandırılmış. Yüksek riskli olarak nitelenen grupta sensitivite 0.21, spesifisite 0.97, NPV 0.99 ve PPV 0.09, genel test doğruluğu 0.96 saptanmış. Sensitivite nispeten düşüktür ve genel popülasyonda veya birinci basamakta tarama için gelişmiş testlere ihtiyaç vardır.

Bu bülten Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) tarafından, bilimsel gelişime katkı amacı ile hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır. Makalelerin içeriklerinin tıbbi ve hukuki sorumluluğu ilgili yazar ve yayınevlerine aittir. Paylaşılması istenen güncel makalelerin, formata uygun bir şekilde dernek e-posta adresine (tasl@tasl.org.tr) yollanması gerekmektedir. TKAD adına sahibi: Ramazan İdilman (Başkan) Bülten editörü: Arif Mansur Coşar